

Spoelmoeistof, steriel en endo toxinevrij	- af van de toepassing.	van de patiënt. Buiten bereik van kinderen bewaren. Wan
Samenstelling	Overdosering	neer er gevaar is dat grotere
1000 ml vloeistof bevat:	Overdosering tijdens wond	hoeveelheden van de oplos
Natriumchloride 9,00 g	spoeling en intra operatieve	sing worden geabsorbeerd,
in water voor injecties	toepassing kan aanleiding ge	- bijvoorbeeld bij gebruik voor
Electrolyten: mmol/l	ven tot absorptie van de spoel	grote lichaamsholten of grote
Natrium 154	vloeistof, wat kan leiden tot	wondoppervlakken, mag de
Chloride 154	hypervolemie in de vorm van	oplossing niet worden gebruikt
Indicaties	een hypotonische	bij patiënten met hyperhydra
Voor het spoelen en schoon	hyperhydratie (hyponatriëmie).	- tie. In deze omstandigheden
maken tijdens chirurgische	Hoofdpijn, misselijkheid, on	moet de oplossing bovendien
ingrepen Voor het spoelen van	rust en desoriëntatie zijn	met de nodige voorzichtigheid
(brand)wonden	symptomen van hyperhydratie.	worden gebruikt bij patiënten
Voor het bevochtigen van	In ernstige gevallen kan een	met
wondverband en gazen	comateus beeld ontstaan.	- hypertonische dehydratie;
Voor het spoelen en schoon	Bij overdosering	- hypokalemie;
maken van blaascatheters	- Stoppen met het spoelen, cor	- - hypernatremie;
Voor het spoelen en schoon	rectie van de water- en elec	- hyperchloremie;
maken van stoma's	trolytenbalans afhankelijk van	- aandoeningen waarbij
Voor het spoelen en schoon	klinische situatie.	een beperkte natriumin-
maken van instrumenten en	Waarschuwingen en voor	name is aangewezen, zoals
apparatuur	zorgen	cardiale insufficiëntie, al-
Voor intra- en postoperatief	Niet gebruiken als infusie-	gemeen oedeem, pulmo-
spoelen (endoscopische in	vloeistof. Vloeistof alleen	nair oedeem, hypertensie,
grepen zonder HF stroom, na	- gebruiken indien de vloeistof	eclampsie en ernstige nierin-
T.U.R. operaties)	helder en de verpakking on	- sufficiëntie.
Voor het vullen van bevocht	geschonden is. Voor éénmalig	NaCl 0,9 % B. Braun mag niet
gingsapparatuur (het gebruik	gebruik, eventuele restanten	worden gebruikt voor intra
van een container van 100 ml	dienen vernietigd te worden.	- thecale irrigatieprocedures.
of meer wordt aangeraden)	Het opnieuw gebruiken van	- Bijwerkingen
Voor het mechanisch spoelen	producten voor eenmalig ge	Niet bekend.
van de ogen (het gebruik van	bruik creëert een mogelijk	Houdbaarheid
een 30 ml flacon wordt aan	risico voor de patiënt of de	Niet gebruiken na de op de
bevolen)	gebruiker. Het kan leiden tot	- verpakking aangegeven da
Voor het spoelen van de neus	contaminatie en/of bescha	tum.
(het gebruik van een 30 ml fla	diging van het functionele	Datum laatste herziening
con wordt aanbevolen)	vermogen. Contaminatie en/	0310
Dosering	of een beperkte functionaliteit	
De hoeveelheid vloeistof hangt	van het product kan leiden	
	tot letsel, ziekte of de dood	