

Pediatric Dual Head Stethoscope

Duofono pediatrico
 Stéthoscope double pavillon
 Dual Stethoscope
 Estetoscópio de doble cabeza
 Στήθοσκοπιo με δυο κεφαλάς
 سماعة مزدوج الرأس

www.gimaitaly.com

GIMA

REF 32506 - 32508 - 32509 - 32511 - 32513 - 32515

Gima s.p.a. - Via Marconi, 1 - 20090 Gosselo (MI) Italy
 gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
 www.gimaitaly.com
 Made in Taiwan



PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.

ES - **Precaución** Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto cardíaco o un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar.

PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.

ES - **Precaución** Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto cardíaco o un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar.

PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.



GB - **How to use** Position the stethoscope so that they are inclined at 15° and the ear tubes are in contact with the chest wall. Do not use the stethoscope with the ear tubes in contact with the chest wall. Do not use the stethoscope with the ear tubes in contact with the chest wall.

PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.

ES - **Precaución** Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto cardíaco o un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar.

PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.

ES - **Precaución** Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto cardíaco o un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar.

PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.

ES - **Precaución** Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto cardíaco o un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar.

PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.

ES - **Precaución** Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto cardíaco o un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar. Evitar el uso de este estetoscopio en niños con un defecto del conducto pulmonar.

PT - **Precautione** Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto cardiaco o un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare. Evitare di usare questo stetoscopio su bambini con un difetto del condotto polmonare.